

Toda nuestra
experiencia
para su ÉXITO



**Excelente control de
Chanchitos blancos
y Pulgones en
arándanos y otros
berries**



Bayer CropScience
Si es Bayer, es bueno



VENTAJAS

- Insuperable formulación, con óptima penetración foliar.
- “Mejor retención” aún en plantas difíciles de mojar, ingreso más rápido al interior del tejido vegetal.
- “Mejor efecto knock-down” o de volteo.
- Categoría Toxicológica: Clase III – Producto Poco Peligroso.
- Consistentemente mejor actividad que la obtenida con formulaciones estándares contra insectos con sensibilidad reducida.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Concentración	Observaciones
Arándanos Frambuesos Boysenberries Moras Cranberries Gooseberries Zarzaparrillas Loganberries Elderberries	Chanchitos blancos: de cola gruesa, de los frutales	80 - 100 cc/100 L de agua	Aplicar al observar los primeros ejemplares sobre el follaje. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada.
	Pulgones: negro de la alfalfa, del melón, verde de los cítricos, de la frutilla	30 - 50 cc/100 L de agua	
Frutillas	Pulgones: negro de la alfalfa, del melón, verde de los cítricos, de la frutilla	30 - 50 cc/100 L de agua	Mojar adecuadamente para lograr un buen control. Aplicar al observarse los primeros adultos sobre el follaje. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada.

Confidor® Forte se recomienda también para el control de chanchitos blancos, pulgones y langostinos en frutales, así como para el control de mosquitas blancas y pulgones en hortalizas.

No se recomienda aplicar **Confidor® Forte** en tratamiento con bajo volumen de agua, como ULV, aplicaciones con maquinarias electrostáticas, ni en aplicaciones aéreas vía avión o helicóptero, ni a través de riegos tecnificados.



Fonos: (2) 520 8200 Santiago
(51) 23 3728 Coquimbo
(72) 39 1017 Rancagua
(73) 21 3796 Linares
(45) 33 2866 Temuco

www.bayercropscience.cl

ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
Lea toda la etiqueta antes de usarlo.





CARACTERÍSTICAS

Confidor® Forte es un insecticida que pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides. Posee excelentes propiedades sistémicas, de contacto e ingestión, con efecto anti-alimentario y poderosa efectividad, especialmente indicado para el control de chanchitos blancos (*Pseudococcus spp*) y otros insectos chupadores en arándanos y otros frutales menores.

FORMULACIÓN DIFERENTE: Superior y Exclusiva

Confidor® Forte contiene 200 g/L del ingrediente activo **Imidacloprid** y está formulado como Concentrado Soluble (SL).

Confidor® Forte trae en su formulación una serie de coadyuvantes que permiten que su penetración sea mayor y más rápida, y sea menos afectada por lluvias y radiación UV, en comparación a las formulaciones tradicionales.

CONTROL DE CHANCHITOS BLANCOS EN ARÁNDANOS

El chanchito blanco es una plaga cuarentenaria de reciente aparición en los cultivos de arándanos, de manera que ésta se encuentra en proceso de expansión.

Para un control exitoso de chanchitos blancos en arándanos y otros berries, es necesario intervenir temprano en la temporada, previo al inicio de la floración, cuando las poblaciones de la plaga estén comenzando a desplazarse hacia los racimos florales, de manera de mantenerlas bajo los umbrales que puedan afectar la fruta de exportación.


No se recomienda aplicar **Confidor® Forte** en floración, por lo cual, de ser necesario aplicarlo en días cercanos, deberán retirarse las colmenas el día de la aplicación.

RESULTADOS DE ENSAYOS

Penetración de Imidacloprid después de 48 horas de aplicado.


Dr. Bauer (Bayer CropScience, Alemania)

Gracias a los componentes de última generación que se han utilizado en esta nueva formulación, el ingrediente activo ingresa más rápido y en mayor cantidad a la planta lo que mejora el Knock-down o efecto de voldeo sobre las plagas a controlar.



Control de chanchitos blancos en arándanos.

Convenio de Investigación Bayer S.A. / U. de Concepción. Tesis Felipe Ulloa
Ing. Agr. Ph.D. Pedro Casals. 2006 - 2007



REGISTROS, TOLERANCIAS Y CARENCIAS

Para obtener datos específicos y fundamentados de registros, tolerancias y carencias del ingrediente activo de **Confidor® Forte**, para enfrentar los diferentes mercados de exportación de arándanos y otros berries, favor contactar a nuestro Depto. Técnico.

MANEJO INTEGRADO

Confidor® Forte reúne todos los requisitos para ser usado en un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP), debido a las siguientes características:

- Baja Toxicidad.
- Grupo químico distinto a los convencionales (organofosforados, carbamatos y piretroides).
- Muy buena fitocompatibilidad.
- Largo efecto residual y de protección.
- Buen perfil medioambiental.

