



EL HERBICIDA DE CONTACTO VERSÁTIL

Prodigo



Bayer CropScience

Si es Bayer, es bueno.

Prodigo


EL HERBICIDA

■ CARACTERÍSTICAS

Prodigo 600 SC es un herbicida de contacto, que se aplica en post - emergencia temprana de las malezas, y que se encuentra especialmente recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha. En Ajos aplicar en post - emergencia temprana y en Cebollas a partir de los 10 días post - transplante, pudiendo ir en mezcla con otros herbicidas para ampliar su espectro de acción, tales como Raft. En Maravilla, se aplica en post - emergencia temprana de malezas, cuando el cultivo se encuentra entre 2 y 4 hojas verdaderas. En Papas aplicar desde inmediatamente después de la plantación hasta 5 - 7 días antes de la emergencia de las Papas.

■ MODO DE ACCIÓN

Prodigo se aplica sobre las malezas en activo crecimiento, inhibiendo las síntesis de pigmentos e indirectamente la fotosíntesis. Detiene el crecimiento de las malezas dentro de las primeras 48 horas de aplicado. Sin embargo, los síntomas de control como clorosis y muerte, se producen no antes de una semana después de la aplicación.



■ ESPECTRO DE ACCIÓN

Prodigo controla malezas anuales principalmente de hoja ancha, como Quingüilla, Bledo, Malvilla y Rábano, entre otras, en sus primeros estados de desarrollo, entre cotiledones y primer par de hojas verdaderas.



A DE CONTACTO VERSÁTIL

■ RESULTADOS DE ENSAYOS

Se han realizado en Chile, durante los últimos años, diversos ensayos en los cultivos registrados, tanto con instituciones de investigación, como por parte de nuestra área de Investigación y Desarrollo.


Programa de Control de Malezas en

Cebollas con mezclas de

Prodigio en post - transplante.

Población de malezas a los 45 días
post-aplicación.

Chépica, Consultora CIFRA, 2005



Control de Malezas en Maravilla con Prodigio en post - emergencia.


INIA-Quilamapu,

Ing. Agr. Ph. D. A. Pedreros,
2004-2005




DDA: Días después de la aplicación

PSI: Pre-siembra incorporado



■ ÉPOCA DE APLICACIÓN

Prodigio se puede incluir en Programas de Manejo de Malezas desde los 10 días de la plantación en Cebollas y entre 2 y 4 hojas de la Maravilla. Prefiera el uso de diferentes herbicidas en forma integrada, alternando y mezclando diferentes ingredientes activos para lograr un control exitoso de malezas.



Prodigo

■ VENTAJAS

- Controla malezas difíciles como Rábano y Malvilla en sus primeros estados de desarrollo.
- Uso en post - emergencia temprana, complementando su Programa de Control de Malezas.
- Adecuada selectividad en: Cebollas, Ajos, Maravilla y Papas.
- Excelente acompañante en mezcla con otros herbicidas, como Raft.

■ RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Malezas	Dosis (L / ha)	Observaciones
Cebollas	Bledo Quingüilla Chamico Rábano Verdolaga Malvilla Ortiga Chinilla	1,5	Aplicar desde los 10 días post - transplante, con malezas en activo crecimiento y desarrollo, desde que éstas se encuentran en etapa de cotiledones hasta 2 hojas verdaderas. Dependiendo del desarrollo de las malezas, realizar máximo tres aplicaciones durante la temporada, con una frecuencia de aplicación de 10 - 15 días. Considerar volumen de aplicación entre 200 y 300 L de agua / ha.
Maravilla		1,5	Aplicar en post - emergencia temprana, desde que la maravilla tenga 2 hojas verdaderas. Aplicar con malezas desde cotiledones a 2 hojas verdaderas. Realizar máximo una aplicación durante la temporada. Considerar volumen de aplicación entre 200 y 300 L de agua / ha.
Ajos		1,5	Aplicar en post - emergencia del cultivo, cuando las malezas se encuentren entre cotiledones y 2 hojas verdaderas. Considerar volumen de aplicación entre 200 y 300 L de agua/ha. Realizar máximo 3 aplicaciones durante la temporada, con una frecuencia de aplicación de 10 a 15 días, o cuando se produzca una nueva emergencia de las malezas.
Papas		2 - 3	Aplicar desde inmediatamente después de la plantación, hasta 5 a 7 días antes de la emergencia de las papas. Utilice la dosis baja cuando se aplique en mezcla con otros herbicidas, cuando exista un porcentaje inferior a 2 % de materia orgánica y baja presión de malezas. En caso contrario considerar la dosis mayor. Considerar volumen de aplicación entre 200 y 300 L de agua / ha. Realizar máximo una aplicación durante la temporada.

Importante: Aplicaciones en estados de menor desarrollo de las malezas incrementan su eficacia.



ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
Lea toda la etiqueta antes de usarlo.

Fonos: (2) 520 8200 Santiago
(51) 23 3728 Coquimbo
(72) 39 1017 Rancagua
(73) 21 3748 Linares
(45) 26 8416 Temuco

www.bayercropscience.cl

